

*Afrixalus septentrionalis morerei* subsp. nov.

*Holotype*: N° 9447 *in* SCHIØTZ (1975: 97), mâle adulte (longueur museau-anus: 21,5 mm), provenant de la forêt de Dabaga, Tanzanie (localité N°9 de Tanzanie sur la carte de la fig. 1 *in* SCHIØTZ, 1975: 9).

*Paratypes*: Les spécimens rapportés à *Afrixalus pygmaeus pygmaeus* par SCHIØTZ (1974, 1975), et dont cet auteur donne les numéros de collection, soit: N° 7114 (femelle), 7169, 7170 et 7172 (mâles) *in* SCHIØTZ (1975: 97), de Tiwi, Kénya; N° 8749 (mâle) *in* SCHIØTZ (1975: 97), de Kingupira, Tanzanie; MCZ 25165 (mâle) et 25166 (femelle), des Siga Caves, Tanzanie (spécimens signalés par LOVERIDGE, 1942: 398, sous le nom de *Megalixalus brachycnemis*, puis par SCHIØTZ, 1974: 15, sous celui d'*Afrixalus pygmaeus pygmaeus*); ZMB 36102 (mâle), de Tanga, Tanzanie (holotype de *Hyperolius pygmaeus* Ahl, 1931: 273).

*Description*: Voir la description et les figures d'*Afrixalus pygmaeus pygmaeus* dans SCHIØTZ (1974: 14-15, fig. 7-8; 1975: 87-89, fig. 86). Le spécimen dessiné en fig. 7 de SCHIØTZ (1974: 14), qui est apparemment aussi celui qui se trouve en deuxième position en partant de la droite sur la fig. 86 de SCHIØTZ (1975: 87), provient de la localité-type de la sous-espèce, la forêt de Dabaga. SCHIØTZ (1974, 1975) ne donnant pas les numéros de collection des spécimens figurés, il n'est toutefois pas certain qu'il s'agisse de l'holotype, bien que ce soit fort vraisemblable.

*Répartition*: Extrême sud-est du Kénya, Tanzanie, Malawi, Mozambique, peut-être Afrique-du-Sud (SCHIØTZ, 1974, 1975). POYNTON (*in* FROST, 1985: 223) a récemment suggéré que les populations du Mozambique et d'Afrique-du-Sud jusqu'ici rapportées à l'espèce *Afrixalus pygmaeus* représentent vraisemblablement une espèce distincte.

*Abréviations utilisées*: MCZ, Museum of Comparative Zoology, Harvard, Cambridge; ZMB, Zoologisches Museum, Berlin.